

コロナワクチン接種を受ける方への必読事項

- ・予約の5分前に会場へお越しください。
- ・接種前にご自宅で体温を測定ください。
- ・持病のある方は接種までにかかりつけ医に接種可能か確認の上接種をお願いします。
当院での判断は困難です。
- ・ワクチン接種前後に別の注射を接種される方は13日以上あけて下さい。
- ・付添いの方（大人、子ども、ベビー）は、お断りしております。※院内に入って頂けません※
- ・キャンセルはワクチンの破棄を防ぐ為、ご遠慮いただいております。

- ・下記に当てはまる方は接種できませんので当院へご連絡下さい。

○ワクチンの接種が受けられない方

- ① 明らかに発熱している方（37.5℃以上）
- ② 重篤な急性疾患にかかっている方
- ③ 過去にワクチンでアナフィラキシーを呈したことがある方
- ④ 上記以外に医師が予防接種を行うことが不適切な状態にあると判断した方
- ⑤ 17歳以下の方

○持ち物

- ・接種券(接種済証・予診票一体型) ※お忘れになられるといかなる場合も接種頂けません
- ・大津市外の方は市が発行した「住所地外接種届出済証」
但し、当院通院中の妊婦様は必要ありません。
大津市保健所問い合わせ先 0570-002-092
- ・記入済の「予診票」（特に、署名漏れに注意して下さい。）
- ・身分証明書

○服装

- ・“腕の上の方”に接種しますので、半袖で来てください。

○接種会場

- 日曜日 → リプロダクション浮田クリニック
平日 → 浮田クリニック

コロナワクチンを接種された方へ

○接種当日の過ごし方

① 接種部位は、揉んだり、こすったりしないでください。

当日の入浴は問題ありませんが、接種部位を強くこする事は避けてください。

② 接種当日の激しい運動は控えてください。

③ ワクチンを受けた後は、待機室で一定時間様子を見ていただきます。

15分：一般

30分：以下に当てはまる方

- ・ 心血管系・腎疾患・肝疾患・血液疾患・発育障害等の基礎疾患を有する方
- ・ アナフィラキシーを含む即時型のアレルギー反応の既往歴がある方
- ・ 予防接種で接種後2日以内に発熱や全身性発疹等のアレルギーを疑う症状が出た既往がある方・けいれんの既往がある方
- ・ 免疫不全の診断を受けている、または近親者に先天性免疫不全の方がいる方
- ・ ワクチン接種液の成分に対してアレルギーの出る可能性がある方
- ・ 食物アレルギー、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、アレルギー体質のいずれかがある方
- ・ 採血等で気分が悪くなったり、失神を起こしたことがある方

○接種後、数日間の健康観察

接種後、数日間のご自身の体調に注意してください。下記の症状は、通常、数日以内に治まるとされています。解熱消炎鎮痛剤などでの対応となりますが、病気治療中の方は、その使用については主治医とご相談ください。

注射した部位の痛み、腫れ 下痢 筋肉や関節の痛み 頭痛

疲労、寒気、発熱 吐き気、嘔吐

- ・ 接種当日に当院でコロナの処方箋は可能ですが自費500円となります。
- ・ ひどい痛み、腫れ、高熱など重い症状と思われる場合は医師の診察を受けてください。

《妊婦さまへ》

- ・ 接種後、下腹部痛、出血、胎動減少の症状を認めた場合には当院へご連絡ください。
- ・ 38℃を超える発熱を認めた場合には連絡して下さい。

(コロナをお持ちの方は内服して下さい。内服後も発熱が続く場合ご連絡下さい)

【接種後の身体症状の相談先】

○滋賀県コールセンター（24時間対応）

9:00～18:00	077-528-3588
18:00～9:00	077-528-3621

※妊婦さま以外のクリニックへの電話はお控えください。

当院への電話が集中してしまうと当院通院中の患者様の連絡がつながりにくくなります。

妊婦様で、38℃以上の発熱、下腹痛、出血、胎動減少を認めた方は
浮田クリニック（077-574-3751）までご連絡下さい。

○副反応による救済制度

一般的にワクチン接種では副反応による健康被害が極めて稀ではあるものの
避けることができないことから、国による健康被害救済制度が設けられています。
新型コロナウイルスワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、
予防接種法に基づく救済を受けることができます

浮田クリニック