# 0～7歳までの予防接種スケジュール表　ワクチンデビューは生後2ヵ月の誕生日

お名前：（　　さま　）

生年月日：　　年　月　日

| | ● 定期接種<br>■ 任意接種 | 出生時 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 4ヵ月 | 5ヵ月 | 6ヵ月 | 9ヵ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不活化ワクチン | ● Hib（ヒブ）（インフルエンザ菌b型） | | 月　日 ① | 月　日 ② | 月　日 ③ 初回接種は27日以上おいて3回接種しましょう | | | | 月　日 追加接種：3回目接種終了から7ヶ月～13ヶ月の間に接種しましょう | | | | | | |
| 不活化ワクチン | ● プレベナー（小児用肺炎球菌） | | 月　日 ① | 月　日 ② | 月　日 ③ 初回接種は27日以上おいて3回接種しましょう | | | | 月　日 追加接種：3回目接種終了から60日以上あけて1歳を過ぎてから接種しましょう | | | | | | |
| 生ワクチン | ● ロタウイルス | | 月　日 ① | 月　日 ②終了 | | | | | | | | | | | |
| 不活化ワクチン | ● B型肝炎（ビームゲン） | | 月　日 ① | 月　日 ② | | | | 月　日 追加接種：1回目終了後から20週～24週の間に接種しましょう（1歳以降自費） | | | | | | | |
| 不活化ワクチン | ● DPT-IPV（四種混合） | | 月　日 ① | 月　日 ② | 月　日 ③ 初回接種は27日以上おいて3回接種しましょう | | | | 月　日 追加接種：3回目接種終了後12ヶ月～18ヶ月の間に接種しましょう ※二種混合（DT）を11歳で追加接種します | | | | | | |
| 生ワクチン | ● BCG | | | | | 月　日 生後5ヶ月～8ヶ月の間に接種しましょう | | | | | | | | | |
| 生ワクチン | ● 麻しん・風しん（MR混合） | | | | | | | | | 月　日 第1期　1歳のお誕生日を迎えたら接種しましょう（2歳以降自費） | | | 月　日 第2期（小学校入学前の1年間に接種） | | |
| 生ワクチン | ● 水痘（みずぼうそう） | | | | | | | | | 月　日 ① | 月　日 ② 3歳までに2回接種が好ましい（6ヶ月～1年までの間隔をおいて） | | | | |
| 生ワクチン | ■ おたふくかぜ | | | | | | | | | 月　日 ① | | | 月　日 ②小学校入学前の1年間に接種 | | |
| 不活化ワクチン | ● 日本脳炎 | | | | | | | 第1期：3歳から4歳で1～4週間隔で2回接種 | | | 月　日 ① | 月　日 ② | 月　日 ③ その後、概ね1年間隔をおいて4歳から5歳で1回接種。追加は9歳以降 | | |
| 不活化ワクチン | ■ インフルエンザ | | | | | | | | | 月　日 ① | 月　日 ② ※ 2～4週間あけて2回接種。毎年10月頃より開始 | | | | |

麻しん風しん / おたふくかぜ / 水痘
1歳の誕生日が来たら接種しましょう。

Hib / プレベナー / 四種混合
ロタリックスの必要回数を早期に完了するには、同時接種が必要です。

定期接種のクリニック推奨期
定期接種可能期間
任意接種のクリニック推奨期間
任意接種可能期間

不活化ワクチン　接種後7日間あけます
生ワクチン　接種後28日間あけます

上記の表内のワクチンはすべて当クリニックで接種可能です。

産科　婦人科　漢方治療　健診と予防接種
浮田クリニック
UKITA CLINIC